

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN
OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2020.

Name of Subject: Math science Group Session: _____

Group: 1st

Group: 2nd

Q. Nos	Paper Code 3191	Paper Code 3193	Paper Code 3195	Paper Code 3197
1	C	C	D	A
2	B	A	D	C/D
3	C	B	D	D
4	A	B	A	C
5	C	B	C	A
6	D	D	B	B
7	C	D	C	B
8	A	D	A	B
9	B	A	C	D
10	B	C	D	D
11	B	B	C	D
12	D	C	A	A
13	D	A	B	C
14	D	C	B	B
15	A	D	B	C
16				
17				
18				
19				
20				

Q. Nos	Paper Code 3192	Paper Code 3194	Paper Code 3196	Paper Code 3198
1	B	D	B	D
2	C	B	C	B
3	D	A	D	B
4	D	C	A	D
5	B	A	B	B
6	B	B	C	A
7	D	C	D	C
8	B	D	D	A
9	A	A	B	B
10	C	B	B	C
11	A	C	D	D
12	B	D	B	A
13	C	D	A	B
14	D	B	C	C
15	A	B	A	D
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت صحیح سوالیہ پرچہ امارکنگ Key

ہم نے مضمون ریاضی (سائنس) پرچہ B گروپ I, II سیکم 10th میٹرک سالانہ امتحان 2020 کا سوالیہ پرچہ انشائیہ و معروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کر لیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کر لیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کر لیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم / Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 05-03-2020

S.#	Name	Designation	Institution	Mohile No	Signature
1	Naveed Akhtar	SST (Sc)	Govt Model H/S Sham, Sahad malfam.		
2	M. Abu Bakar	SST (Sc)	Govt. S/S Gomia H/S Daulat Gate		
3	Ghulam Shabbir	SST (Sc)	Govt comprehensive HSS Multan		
4	محمد فاروق لنگاہ	SST (Sc)	GHSS Qadirpur LAR MULTAN		
5					

Re-Checked By (معروضی "Key" اور ہدایات کے حوالہ سے مکمل طور پر چیک کر لیا ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔)

1	Allah Ditta Ajiz	SST (Sc)	Govt. New Millat H/S Mumtazabad Multan
2	Muhammad Abuzar	SST (Sc)	Govt. New Millat H/S Mumtazabad Multan

ہم نے درج بالا سوالیہ پرچہ کے درج ذیل دستخط کنندگان کے ذریعہ دوبارہ چیک کیا ہے۔

تاریخ: 6-3-20

نوٹ: کوئی غلطی نہ ہو کہ 3197 کے سوالیہ پرچہ میں 1 اور D دونوں کو درست قرار دیا جائے۔

2020 (A)

SSC PART-II (10th CLASS)

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-I

TIME ALLOWED: 2.10 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

MAXIMUM MARKS: 60

NOTE: Write same question number

and its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

(i) Solve the given equation using quadratic formula:

$$\sqrt{3}x^2 + x = 4\sqrt{3}$$

سوال نمبر 2- کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) دی گئی دو درجی مساوات کو دو درجی فارمولا کے استعمال سے حل کیجیے۔

$$\sqrt{3}x^2 + x = 4\sqrt{3}$$

(ii) Write the given equation in standard form:

$$\frac{1}{x+4} + \frac{1}{x-4} = 3$$

(ii) دی گئی مساوات کو معیاری صورت میں تحریر کیجیے۔

(iii) Define Radical Equation.

(iii) جذری مساوات کی تعریف کیجیے۔

(iv) Evaluate $\omega^{37} + \omega^{38} + 1$ (iv) قیمت معلوم کیجیے۔ $\omega^{37} + \omega^{38} + 1$

(v) Find the product of complex cube roots of unity.

(v) اکائی کے غیر حقیقی جذور المکعب کا حاصل ضرب معلوم کیجیے۔

(vi) Find the discriminant of $6x^2 - 8x + 3 = 0$ (vi) فرق کنندہ معلوم کیجیے۔ $6x^2 - 8x + 3 = 0$

(vii) State theorem of Componendo-dividendo.

(vii) مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت بیان کیجیے۔

(viii) Find Fourth Proportional to 8, 7, 6

(viii) چوتھا تناسب معلوم کیجیے۔ 8, 7, 6

(ix) Find the value of P if $2p + 5 : 3p + 4 = 3 : 4$ (ix) P کی قیمت معلوم کیجیے اگر $2p + 5 : 3p + 4 = 3 : 4$

3. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

(i) Resolve into Partial fractions. $\frac{x-11}{(x-4)(x+3)}$

سوال نمبر 3- کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے۔ $\frac{x-11}{(x-4)(x+3)}$

(ii) Define Proper fraction and give its example.

(ii) واجب کسر کی تعریف کیجیے اور مثال بھی دیجیے۔

(iii) If $X = \phi$ and $Y = Z^+$ then find $X \cap Y$ (iii) اگر $X = \phi$ اور $Y = Z^+$ ہو تو $X \cap Y$ معلوم کیجیے۔(iv) Find a and b if $(a-4, b-2) = (2, 1)$ (iv) a اور b معلوم کیجیے اگر $(a-4, b-2) = (2, 1)$

(v) Define Into Function.

(v) ان ٹو تفاعل کی تعریف کیجیے۔

(vi) If set M has 5 elements, then find the number of binary relations in M .(vi) اگر سیٹ M کے 5 ارکان ہوں تو M میں ثنائی روابط کی تعداد معلوم کیجیے۔

(vii) Find geometric mean of observations 2, 4, 8 using basic formula.

(vii) ہدات 2, 4, 8 کے لیے بنیادی فارمولا سے اقلیدی اوسط معلوم کیجیے۔

(viii) Define Arithmetic Mean.

(viii) حسابی اوسط کی تعریف کیجیے۔


(ix) Define Range.

(ix) سعت کی تعریف کیجیے۔

(ورق الٹے)

(2)

$$12 = 2 \times 6$$



سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) زاویہ کو ریڈین میں تبدیل کریں۔ 300°

4. Attempt any six parts.

(i) Convert the angle into radians 300° .

(ii) Find r when $\ell = 52 \text{ cm}$ and $\theta = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$.

(ii) r معلوم کریں جبکہ $\ell = 52 \text{ cm}$ اور $\theta = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$

(iii) Define Acute Angle.

(iii) حادہ زاویہ کی تعریف کریں۔

(iv) Define Collinear Points.

(iv) ہم خط نقاط کی تعریف کریں۔

(v) Define Tangent.

(v) مماس کی تعریف کریں۔

(vi) Define Sector of a Circle.

(vi) دائرے کے سیکٹر کی تعریف کریں۔

(vii) Define Circumangle.

(vii) محاصرہ زاویہ کی تعریف کریں۔

(viii) Define Circumference.

(viii) محیط کی تعریف کریں۔

(ix) The length of each side of a regular octagon is 3 cm.

(ix) ایک منظم ثمین کے ضلع کی لمبائی 3 سم ہے۔ اس کا احاطہ معلوم کریں۔

Measure its perimeter.

SECTION-II حصہ دوم

$$24 = 8 \times 3$$

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

NOTE: Attempt any three questions but question No.9 is compulsory.

5.(A) Solve the equation $\sqrt{3x+7} = 2x+3$

5۔ (الف) مساوات $\sqrt{3x+7} = 2x+3$ کو حل کریں۔

(B) Prove that $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x+y+z)(x+\omega y+\omega^2 z)(x+\omega^2 y+\omega z)$ (ب) ثابت کیجیے کہ

6۔ (الف) مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے $\frac{x+2y}{x-2y} + \frac{x+2z}{x-2z}$ کی قیمت معلوم کیجیے اگر $x = \frac{4yz}{y+z}$ ہو۔

6.(A) Using Theorem of Componendo-dividendo find the value of $\frac{x+2y}{x-2y} + \frac{x+2z}{x-2z}$ if $x = \frac{4yz}{y+z}$

(B) Resolve into partial fractions. $\frac{3x+7}{(x^2+1)(x+3)}$ (ب) جزوی کسور میں تحلیل کیجیے۔ $\frac{3x+7}{(x^2+1)(x+3)}$

7۔ (الف) اگر $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ، $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ اور $B = \{2, 3, 5, 7\}$ تو ثابت کیجیے $(A \cap B)' = A' \cup B'$

7.(A) If $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ and $B = \{2, 3, 5, 7\}$ then prove $(A \cap B)' = A' \cup B'$

(B) The marks of six students in mathematics are as follows. (ب) ریاضی میں چھ طالب علموں کے نمبرز درج ذیل ہیں۔ تغیریت معلوم کریں۔ Determine variance.

Student No.	1	2	3	4	5	6
Marks	60	70	30	90	80	42

8.(A) Verify the identity. $\frac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta} - \frac{1-\sin\theta}{1+\sin\theta} = 4\tan\theta \sec\theta$ (الف) مماثلت کو ثابت کیجیے۔

(B) Circumscribe a circle about an equilateral triangle ABC with each side of length 4 cm. (ب) مساوی الاضلاع مثلث ABC کا محاصرہ دائرہ بنائیں جب کہ اس کے ہر ضلع کی لمبائی 4 سم ہو۔

9. Prove that a straight line, drawn from the centre of a circle to bisect a chord (which is not a diameter) is perpendicular to the chord. (الف) ثابت کیجیے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر (جو قطر نہ ہو) کی تنصیف کرنے والا قطعہ خط، وتر پر عمود ہوتا ہے۔

OR یا

Prove that the opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary. (ب) ثابت کیجیے کہ کسی دائرے کی دائروی چوکور کے متقابلہ زاویے، سپلیمنٹری زاویے ہوتے ہیں۔

PAPER CODE

NUMBER: 3191

2020 (A)

SSC PART-II (10th CLASS)

رول نمبر

124

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-I

ریاضی (سائنس گروپ) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) The number of methods to solve a quadratic equation are: (1) دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقے ہیں۔ (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- (2) Product of cube roots of unity is: (2) اکائی کے جذور المکعب کا حاصل ضرب ہے۔ (A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 3
- (3) If α , β are the roots of $px^2 + qx + r = 0$, then sum of the roots 2α and 2β is: (3) اگر α , β مساوات $px^2 + qx + r = 0$ کے روٹس ہوں تو 2α اور 2β کا مجموعہ ہے۔ (A) $-\frac{q}{p}$ (B) $\frac{r}{p}$ (C) $-\frac{2q}{p}$ (D) $-\frac{q}{2p}$
- (4) If $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$, then: (4) اگر $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$ ہو تو: (A) $u = wk^2$ (B) $u = vk^2$ (C) $u = w^2k$ (D) $u = v^2k$
- (5) The third proportional of x^2 and y^2 is: (5) x^2 اور y^2 کا تیسرا تناسب ہے۔ (A) $\frac{y^2}{x^2}$ (B) x^2y^2 (C) $\frac{y^4}{x^2}$ (D) $\frac{y^2}{x^4}$
- (6) A fraction in which the degree of numerator is less than the degree of the denominator is called: (6) کسر جس میں شمار کنندہ کی ڈگری خرج کی ڈگری سے کم ہو، کہلاتی ہے۔ (A) An equation مساوات (B) An improper fraction غیر واجب کسر (C) An identity مماثلت (D) A proper fraction واجب کسر
- (7) If $A \subseteq B$ then $A - B$ is equal to: (7) اگر $A \subseteq B$ ہو تو $A - B$ برابر ہوتا ہے۔ (A) A (B) B (C) ϕ (D) $B - A$
- (8) $A \cup (B \cap C)$ is equal to: (8) $A \cup (B \cap C)$ برابر ہوتا ہے۔ (A) $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ (B) $A \cap (B \cap C)$ (C) $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ (D) $A \cup (B \cup C)$
- (9) The spread or scatterness of observation in a data is called: (9) کسی مواد میں مدات کا پھیلاؤ کہلاتا ہے۔ (A) Average اوسط (B) Dispersion انتشار (C) Central tendency مرکزی رجحان (D) Percentile فیصدی حصہ
- (10) A histogram is a set of adjacent: (10) کالمی نقشہ مجموعہ ہے متعلقہ۔ (A) Squares مربعوں کا (B) Rectangles مستطیلوں کا (C) Circles دائروں کا (D) Triangles مثلثوں کا
- (11) $\operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta =$ (11) $\operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta =$ (A) -1 (B) 1 (C) 0 (D) $\tan\theta$
- (12) A complete circle is divided into: (12) مکمل دائرے کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ (A) 90° (B) 180° (C) 270° (D) 360°
- (13) A circle has only one: (13) ایک دائرے کا صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ (A) Secant خط قاطع (B) Chord وتر (C) Diameter قطر (D) Centre مرکز
- (14) A 4 cm long chord subtends a central angle of 60° . The radial segment of this circle is: (14) ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے۔ دائرے کا رداس ہوگا۔ (A) 1 cm (B) 2 cm (C) 3 cm (D) 4 cm
- (15) The measure of the external angles of a regular octagon is: (15) ایک منظم مشمن کے بیرونی زاویوں کی مقدار ہوتی ہے۔ (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{8}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

PAPER CODE

NUMBER: 3193

2020 (A)

SSC PART-II (10th CLASS)

رول نمبر

125

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-I

ریاضی (سائنس گروپ) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) If $A \subseteq B$ then $A - B$ is equal to: (1) اگر $A \subseteq B$ ہو تو $A - B$ برابر ہوتا ہے۔
(A) A (B) B (C) ϕ (D) $B - A$
- (2) $A \cup (B \cap C)$ is equal to: (2) $A \cup (B \cap C)$ برابر ہوتا ہے۔
(A) $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ (B) $A \cap (B \cap C)$
(C) $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ (D) $A \cup (B \cup C)$
- (3) The spread or scatterness of observation in a data is called: (3) کسی مواد میں مدات کا پھیلاؤ کہلاتا ہے۔
(A) Average اوسط (B) Dispersion انتشار (C) Central tendency مرکزی رجحان (D) Percentile فیصدی حصہ
- (4) A histogram is a set of adjacent: (4) کالمی نقشہ مجموعہ ہے متعلقہ۔
(A) Squares مربعوں کا (B) Rectangles مستطیلوں کا (C) Circles دائروں کا (D) Triangles مثلثوں کا
- (5) $\operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta =$ ----- (5) $\operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta =$ -----
(A) -1 (B) 1 (C) 0 (D) $\tan \theta$
- (6) A complete circle is divided into: (6) مکمل دائرے کو تقسیم کیا جاتا ہے۔
(A) 90° (B) 180° (C) 270° (D) 360°
- (7) A circle has only one: (7) ایک دائرے کا صرف ایک ہی ہوتا ہے۔
(A) Secant خط قاطع (B) Chord وتر (C) Diameter قطر (D) Centre مرکز
- (8) A 4 cm long chord subtends a central angle of 60° . (8) ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے۔ دائرے کا رداس ہوگا۔
The radial segment of this circle is:
(A) 1 cm (B) 2 cm (C) 3 cm (D) 4 cm
- (9) The measure of the external angles of a regular octagon is: (9) ایک منظم مٹھن کے بیرونی زاویوں کی مقدار ہوتی ہے۔
(A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{8}$ (D) $\frac{\pi}{2}$
- (10) The number of methods to solve a quadratic equation are: (10) دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقے ہیں۔
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- (11) Product of cube roots of unity is: (11) اکائی کے جذور المکعب کا حاصل ضرب ہے۔
(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 3
- (12) If α , β are the roots of $px^2 + qx + r = 0$, then sum of the roots 2α and 2β is: (12) اگر α , β مساوات $px^2 + qx + r = 0$ کے روٹس ہوں تو 2α اور 2β کا مجموعہ ہے۔
(A) $\frac{-q}{p}$ (B) $\frac{r}{p}$ (C) $\frac{-2q}{p}$ (D) $-\frac{q}{2p}$
- (13) If $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$, then: (13) اگر $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$ ہو تو:-
(A) $u = wk^2$ (B) $u = vk^2$ (C) $u = w^2k$ (D) $u = v^2k$
- (14) The third proportional of x^2 and y^2 is: (14) x^2 اور y^2 کا تیسرا تناسب ہے۔
(A) $\frac{y^2}{x^2}$ (B) x^2y^2 (C) $\frac{y^4}{x^2}$ (D) $\frac{y^2}{x^4}$
- (15) A fraction in which the degree of numerator is less than the degree of the denominator is called: (15) کسر جس میں شمار کنندہ کی ڈگری مخرج کی ڈگری سے کم ہو، کہلاتی ہے۔
(A) An equation مساوات (B) An improper fraction غیر واجب کسر (C) An identity مماثلت (D) A proper fraction واجب کسر

PAPER CODE

NUMBER: 3195

2020 (A)

SSC PART-II (10th CLASS)

رول نمبر

126

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-I

ریاضی (سائنس گروپ) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1

- (1) A complete circle is divided into: (1) مکمل دائرے کو تقسیم کیا جاتا ہے۔
(A) 90° (B) 180° (C) 270° (D) 360°
- (2) A circle has only one: (2) ایک دائرے کا صرف ایک ہی ہوتا ہے۔
(A) Secant خط قاطع (B) Chord وتر (C) Diameter قطر (D) Centre مرکز
- (3) A 4 cm long chord subtends a central angle of 60° . (3) ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے۔ دائرے کا رداس ہوگا۔
The radial segment of this circle is:
(A) 1 cm (B) 2 cm (C) 3 cm (D) 4 cm
- (4) The measure of the external angles of a regular octagon is: (4) ایک منظم ثمین کے بیرونی زاویوں کی مقدار ہوتی ہے۔
(A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{8}$ (D) $\frac{\pi}{2}$
- (5) The number of methods to solve a quadratic equation are: (5) دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقے ہیں۔
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- (6) Product of cube roots of unity is: (6) اکائی کے جذور التکعب کا حاصل ضرب ہے۔
(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 3
- (7) If α , β are the roots of $px^2 + qx + r = 0$, then sum of the roots 2α and 2β is: (7) اگر α , β مساوات $px^2 + qx + r = 0$ کے رٹس ہوں تو 2α اور 2β کا مجموعہ ہے۔
(A) $-\frac{q}{p}$ (B) $\frac{r}{p}$ (C) $-\frac{2q}{p}$ (D) $-\frac{q}{2p}$
- (8) If $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$, then: (8) اگر $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$ ہو تو:
(A) $u = wk^2$ (B) $u = vk^2$ (C) $u = w^2k$ (D) $u = v^2k$
- (9) The third proportional of x^2 and y^2 is: (9) x^2 اور y^2 کا تیسرا تناسب ہے۔
(A) $\frac{y^2}{x^2}$ (B) x^2y^2 (C) $\frac{y^4}{x^2}$ (D) $\frac{y^2}{x^4}$
- (10) A fraction in which the degree of numerator is less than the degree of the denominator is called: (10) کسر جس میں شمار کنندہ کی ڈگری مخرج کی ڈگری سے کم ہو، کہلاتی ہے۔
(A) An equation مساوات (B) An improper fraction غیر واجب کسر (C) An identity مماثلت (D) A proper fraction واجب کسر
- (11) If $A \subseteq B$ then $A - B$ is equal to: (11) اگر $A \subseteq B$ ہو تو $A - B$ برابر ہوتا ہے۔
(A) A (B) B (C) ϕ (D) $B - A$
- (12) $A \cup (B \cap C)$ is equal to: (12) $A \cup (B \cap C)$ برابر ہوتا ہے۔
(A) $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ (B) $A \cap (B \cap C)$
(C) $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ (D) $A \cup (B \cup C)$
- (13) The spread or scatterness of observation in a data is called: (13) کسی مواد میں مدات کا پھیلاؤ کہلاتا ہے۔
(A) Average اوسط (B) Dispersion انتشار (C) Central tendency مرکزی رجحان (D) Percentile فیصدی حصہ
- (14) A histogram is a set of adjacent: (14) کالمی نقشہ مجموعہ ہے متصل۔
(A) Squares مربعوں کا (B) Rectangles مستطیلوں کا (C) Circles دائروں کا (D) Triangles مثلثوں کا
- (15) $\operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta =$ (15) $\operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta =$
(A) -1 (B) 1 (C) 0 (D) $\tan\theta$

PAPER CODE

NUMBER: 3197

2020 (A)

SSC PART-II (10th CLASS)

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-I

ریاضی (سائنس گروپ) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر بھر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو بھر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1۔

(1) If $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$, then:(1) اگر $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$ ہو تو:

(A) $u = wk^2$

(B) $u = vk^2$

(C) $u = w^2k$

(D) $u = v^2k$

(2) The third proportional of x^2 and y^2 is:(2) x^2 اور y^2 کا تیسرا تناسب ہے۔

(A) $\frac{y^2}{x^2}$

(B) x^2y^2

(C) $\frac{y^4}{x^2}$

(D) $\frac{y^4}{x^2}$

(3) A fraction in which the degree of numerator is less than

(3) کسر جس میں شمار کنندہ کی ڈگری خرج کی ڈگری سے کم ہو، کہلاتی ہے۔

the degree of the denominator is called:

(A) An equation مساوات

(B) An improper fraction غیر واجب کسر

(C) An identity مماثلت

(D) A proper fraction واجب کسر

(4) If $A \subseteq B$ then $A - B$ is equal to:(4) اگر $A \subseteq B$ ہو تو $A - B$ برابر ہوتا ہے۔

(A) A

(B) B

(C) ϕ

(D) $B - A$

(5) $A \cup (B \cap C)$ is equal to:(5) $A \cup (B \cap C)$ برابر ہوتا ہے۔

(A) $(A \cup B) \cap (A \cup C)$

(B) $A \cap (B \cap C)$

(C) $(A \cap B) \cup (A \cap C)$

(D) $A \cup (B \cup C)$

(6) The spread or scatterness of observation in a data is called:

(6) کسی مواد میں مدات کا پھیلاؤ کہلاتا ہے۔

(A) Average اوسط

(B) Dispersion انتشار

(C) Central tendency مرکزی رجحان

(D) Percentile فیصدی حصہ

(7) A histogram is a set of adjacent:

(7) کالمی نقشہ مجموعہ ہے متعلقہ۔

(A) Squares مربعوں کا

(B) Rectangles مستطیلوں کا

(C) Circles دائروں کا

(D) Triangles مثلثوں کا

(8) $\operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = \text{-----}$

(8) $\operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = \text{-----}$

(A) -1

(B) 1

(C) 0

(D) $\tan\theta$

(9) A complete circle is divided into:

(9) مکمل دائرے کو تقسیم کیا جاتا ہے۔

(A) 90°

(B) 180°

(C) 270°

(D) 360°

(10) A circle has only one:

(10) ایک دائرے کا صرف ایک ہی ہوتا ہے۔

(A) Secant خط قاطع

(B) Chord وتر

(C) Diameter قطر

(D) Centre مرکز

(11) A 4 cm long chord subtends a central angle of 60° .(11) ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے۔ دائرے کا رداس ہوگا۔

The radial segment of this circle is:

(A) 1 cm

(B) 2 cm

(C) 3 cm

(D) 4 cm

(12) The measure of the external angles of a regular octagon is:

(12) ایک منظم ثمن کے بیرونی زاویوں کی مقدار ہوتی ہے۔

(A) $\frac{\pi}{4}$

(B) $\frac{\pi}{6}$

(C) $\frac{\pi}{8}$

(D) $\frac{\pi}{2}$

(13) The number of methods to solve a quadratic equation are:

(13) دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقے ہیں۔

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(14) Product of cube roots of unity is:

(14) اکائی کے جذور المکعب کا حاصل ضرب ہے۔

(A) 0

(B) 1

(C) -1

(D) 3

(15) If α, β are the(15) اگر α, β مساوات $px^2 + qx + r = 0$ کے روٹس ہوں تو 2α اور 2β کا مجموعہ ہے۔roots of $px^2 + qx + r = 0$, then sum of the roots 2α and 2β is:

(A) $-\frac{q}{p}$

(B) $\frac{r}{p}$

(C) $-\frac{2q}{p}$

(D) $-\frac{q}{2p}$

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

سوال نمبر 2۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define Exponential Equation and give one example.

(i) قوت نمائی مساوات کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

(ii) Write the quadratic equation in the standard form.

$$\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x} = 6$$

(ii) دو درجی مساوات کو معیاری فارم میں تحریر کیجیے۔

(iii) Solve the equation by using quadratic formula.

$$4x^2 - 3x - 14 = 0$$

(iii) مساوات کو دو درجی فارمولا کی مدد سے حل کیجیے۔

(iv) Find the discriminant of quadratic equation.

$$2x^2 + 3x - 1 = 0$$

(iv) دو درجی مساوات کا فرق کنندہ معلوم کیجیے۔

(v) Evaluate. $(9 + 4\omega + 4\omega^2)^3$ (v) قیمت معلوم کیجیے۔ $(9 + 4\omega + 4\omega^2)^3$

(vi) Without solving, find the sum and the product of the roots of the given quadratic equation.

$$x^2 - 5x + 3 = 0$$

(vi) دی ہوئی دو درجی مساوات کو حل کئے بغیر روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجیے۔

(vii) Define Direct Variation.

(vii) تغیر راست کی تعریف کیجیے۔

(viii) Express 4kg, 2kg 750 gm as ratio $a : b$ and as a fraction in the simplest form.(viii) 2 کلوگرام 750 گرام : 4 کلوگرام کو نسبت $a : b$ اور کسر کی آسان شکل میں ظاہر کریں۔

(ix) Find the fourth proportional to 5, 8, 15.

(ix) چوتھا تناسب معلوم کیجیے۔ 5, 8, 15

3. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

سوال نمبر 3۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Resolve into Partial Fractions. $\frac{7x-9}{(x+1)(x-3)}$ (i) جزوی کسور میں تحلیل کیجیے۔ $\frac{7x-9}{(x+1)(x-3)}$

(ii) What is an Identity?

(ii) مماثلت کیا ہوتی ہے؟

(iii) If $X = \{1, 4, 7, 9\}$ and $Y = \{2, 4, 5, 9\}$ then find $X \cup Y$ (iii) اگر $X = \{1, 4, 7, 9\}$ اور $Y = \{2, 4, 5, 9\}$ ہو تو $X \cup Y$ معلوم کیجیے۔

(iv) Define an "Onto" function.

(iv) آن۔ ٹو تفاعل کی تعریف کیجیے۔

(v) If $X = \{a, b, c\}$ then find number of elements in $X \times X$ (v) اگر $X = \{a, b, c\}$ ہو تو $X \times X$ کے ارکان کی تعداد معلوم کیجیے۔(vi) If $L = \{a, b, c\}$ and $M = \{3, 4\}$ (vi) اگر $L = \{a, b, c\}$ اور $M = \{3, 4\}$ ہو تو $L \times M$ کے دو ثنائی روابط معلوم کیجیے۔then find two binary relations of $L \times M$

(vii) Define Class mark.

(vii) جماعتی نشان کی تعریف کیجیے۔

(viii) Find the arithmetic mean.

12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45

(viii) حسابی اوسط معلوم کیجیے۔

(ix) Find the modal size of shoe for the given data:

(ix) دیا گیا مواد جوتوں کی جسامت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس دیے گئے مواد سے عادیہ معلوم کیجیے۔

4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 5, 7, 5, 8, 8, 8, 6, 5, 6, 5, 7

129

(2)

$$12 = 2 \times 6$$

سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

4. Attempt any six parts.

(i) Verify the identity $(\tan \theta + \cot \theta) \tan \theta = \sec^2 \theta$

(i) مماثلت کو ثابت کریں۔ $(\tan \theta + \cot \theta) \tan \theta = \sec^2 \theta$

(ii) Find 'l' when $r = 4.9 \text{ cm}$ and $\theta = 180^\circ$

(ii) 'l' کی قیمت معلوم کریں جبکہ $r = 4.9 \text{ cm}$ اور $\theta = 180^\circ$ ۔

(iii) Whether the triangle with sides

(iii) مثلث کے اضلاع 5 سم، 7 سم اور 8 سم ہیں۔ کیا وہ حادة الزاویہ، منفرجة الزاویہ یا قائمہ الزاویہ مثلث ہے؟

5cm, 7cm, 8cm is acute, obtuse or right angled triangle?

(iv) Define diameter of a circle.

(iv) دائرے کے قطر کی تعریف کریں۔

(v) Define arc of a circle.

(v) دائرے کی قوس کی تعریف کریں۔

(vi) Define tangent of a circle.

(vi) دائرے کے مماس کی تعریف کریں۔

(vii) Define cyclic quadrilateral.

(vii) سائیکلک چوکور کی تعریف کریں۔

(viii) If $m\overline{AB} = 3 \text{ cm}$ and

(viii) اگر کسی قوس کے دو وتر $\overline{AB}$ اور $\overline{BC}$ کی لمبائیاں بالترتیب 3 سم اور 4 سم ہوں تو قوس کا مرکز معلوم کریں۔

$m\overline{BC} = 4 \text{ cm}$ are the lengths of two chords of an arc then locate the centre of the arc.

(ix) What is meant by Geometry?

(ix) جیومیٹری سے کیا مراد ہے؟

SECTION-II حصہ دوم

$$24 = 8 \times 3$$

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

NOTE: Attempt any three questions but question No.9 is compulsory.

5.(A) Solve $4x = \sqrt{13x + 14} - 3$

5۔ (الف) حل کیجیے۔ $4x = \sqrt{13x + 14} - 3$

(B) Find the value of k

(ب) k کی قیمت معلوم کیجیے اگر مساوات $2kx^2 - 3x + 4k = 0$ کے ریش کا مجموعہ اس کے ریش کے حاصل ضرب کا دو گنا ہو۔

if sum of the roots of the equation $2kx^2 - 3x + 4k = 0$ is twice the product of the roots.

6.(A) $a \propto \frac{1}{b^2}$ and $a = 3$

6۔ (الف) $a \propto \frac{1}{b^2}$ اور $a = 3$ جب $b = 4$ ہے، a معلوم کیجیے جبکہ $b = 8$ ۔

when $b = 4$, find a , when $b = 8$

(B) Resolve into Partial fractions. $\frac{7x + 4}{(3x + 2)(x + 1)^2}$

(ب) جزوی کسور میں تحلیل کیجیے۔ $\frac{7x + 4}{(3x + 2)(x + 1)^2}$

7۔ (الف) اگر $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ، $B = \{2, 4, 6, 8\}$ اور $C = \{1, 4, 8\}$ ہو تو مماثلت ثابت کیجیے۔ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

7.(A) If $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$ and $C = \{1, 4, 8\}$

then prove the identity $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

(B) Calculate variance for the given data:

10, 8, 9, 7, 5, 12, 8, 6, 8, 2

(ب) دیے گئے مواد کا تغیریت معلوم کریں۔

8.(A) Verify identity.

$$\frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = 2 \operatorname{cosec} \theta$$

8۔ (الف) مماثلت ثابت کریں۔

(B) Circumscribe a regular hexagon about a circle of radius 3 cm.

(ب) ایک دائرے کا رداس 3 سم ہے۔ اس کی محاصرہ منظم سدس بنائیں۔

9. Prove that perpendicular from the centre of a circle on a chord bisects it.

9۔ ثابت کیجیے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود، اس کی تنصیف کرتا ہے۔

OR یا

Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal.

ثابت کیجیے کہ زوایے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔

● MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-II

ریاضی (سائنس گروپ) گروپ - دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر

دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) Standard form of quadratic equation is: (1) دوسری مساوات کی معیاری شکل ہے۔
 (A) $bx + c = 0, b \neq 0$ (B) $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ (C) $ax^2 = bx, a \neq 0$ (D) $ax^2 = 0, a \neq 0$
- (2) If α, β are the roots of $px^2 + qx + r = 0$, then sum of the roots 2α and 2β is: (2) اگر α, β مساوات $px^2 + qx + r = 0$ کے روٹس (roots) ہوں تو 2α اور 2β کا مجموعہ ہے۔
 (A) $\frac{-q}{p}$ (B) $\frac{r}{p}$ (C) $\frac{-2q}{p}$ (D) $\frac{-q}{2p}$
- (3) The nature of the roots of equation $ax^2 + bx + c = 0$ is determined by: (3) مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ کے روٹس کی اقسام کو _____ سے معلوم کرتے ہیں۔
 (A) Sum of roots روٹس کا مجموعہ (B) Product of the roots روٹس کا حاصل ضرب
 (C) Synthetic division ترکیبی تقسیم (D) Discriminant فرق کنندہ
- (4) Find x in proportion $4 : x :: 5 : 15$. (4) تناسب $4 : x :: 5 : 15$ میں x معلوم کیجئے۔
 (A) $\frac{75}{4}$ (B) $\frac{4}{3}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) 12
- (5) If $u \propto v^2$, then: (5) اگر $u \propto v^2$ تو:۔
 (A) $u = v^2$ (B) $u = kv^2$ (C) $uv^2 = k$ (D) $uv^2 = 1$
- (6) $\frac{x^3 + 1}{(x - 1)(x + 2)}$ is: (6) $\frac{x^3 + 1}{(x - 1)(x + 2)}$ ایک _____ ہے۔
 (A) A proper fraction واجب کسر (B) An improper fraction غیر واجب کسر
 (C) An identity مماثلت (D) A constant term مستقل رقم
- (7) The set $\{x / x \in \mathbb{W} \wedge x \leq 101\}$ is: (7) سیٹ $\{x / x \in \mathbb{W} \wedge x \leq 101\}$ کہلاتا ہے۔
 (A) Subset ختمی سیٹ (B) Empty set خالی سیٹ (C) Infinite set غیر متناہی سیٹ (D) Finite set متناہی سیٹ
- (8) If number of elements in set A is 3 and in set B is 2, then number of binary relations in $A \times B$ is: (8) اگر کسی سیٹ A میں ارکان کی تعداد 3 اور سیٹ B میں 2 ہو تو $A \times B$ کے ثنائی روابط کی تعداد ہوتی ہے۔
 (A) 2^3 (B) 2^6 (C) 2^8 (D) 2^2
- (9) A histogram is a set of adjacent: (9) کالمی نقشہ مجموعہ ہے متعلقہ _____
 (A) Rectangles مستطیلوں کا (B) Squares مربعوں کا (C) Circles دائروں کا (D) Triangles مثلثوں کا
- (10) The extent of variation between two extreme observations of a data set is measured by: (10) کسی دیئے گئے مواد کی انتہائی مدت کے فرق کی پیمائش کی جاتی ہے۔
 (A) Average اوسط (B) Quartiles چہارمی حصہ (C) Range سعت (D) Percentiles فی صدی حصہ
- (11) $\frac{1}{2} \operatorname{cosec} 45^\circ =$ (11) $\frac{1}{2} \operatorname{cosec} 45^\circ$ برابر ہے۔
 (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (12) Locus of a point in a plane equidistant from a fixed point is called: (12) مستوی کے تمام نقاط کا سیٹ جو معین نقطہ سے برابر فاصلے پر ہوں _____ کہلاتا ہے۔
 (A) Radius رداس (B) Circle دائرہ (C) Circumference محیط (D) Diameter قطر
- (13) A line which has only one point in common with a circle is called: (13) ایک خط جس کا دائرے کے ساتھ صرف ایک نقطہ مشترک ہو، کہتے ہیں۔
 (A) Sine of a circle دائرے کا sine (B) Cosine of a circle دائرے کا cosine
 (C) Tangent of a circle دائرے کا tangent (D) Secant of a circle دائرے کا secant
- (14) A 4 cm long chord subtends a central angle of 60° . The radial segment of this circle is: (14) ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے۔ دائرے کا رداس _____ ہوگا۔
 (A) 1 cm (B) 2 cm (C) 3 cm (D) 4 cm
- (15) The measure of the external angle of a regular hexagon is: (15) ایک منظم سدس کے بیرونی زاویوں کی مقدار ہوتی ہے۔
 (A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{6}$ (D) $\frac{\pi}{9}$

PAPER CODE

NUMBER: 3194

2020 (A)

SSC PART-II (10th CLASS)

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-II

گروپ - دوسرا

ریاضی (سائنس گروپ)

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر پھر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پھر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1 سوال نمبر 1-

- (1) The set $\{x / x \in w \wedge x \leq 101\}$ is: سیٹ $\{x / x \in w \wedge x \leq 101\}$ کہلاتا ہے۔
 (A) Subset ختی سیٹ (B) Empty set خالی سیٹ (C) Infinite set غیر متناہی سیٹ (D) Finite set متناہی سیٹ
- (2) If number of elements in set A is 3 and in set B is 2, then number of binary relation in $A \times B$ is: اگر کسی سیٹ A میں ارکان کی تعداد 3 اور سیٹ B میں 2 ہو تو $A \times B$ کے ثنائی روابط کی تعداد ہوتی ہے۔
 (A) 2^3 (B) 2^6 (C) 2^8 (D) 2^2
- (3) A histogram is a set of adjacent: کالمی نقشہ مجموعہ ہے متعلقہ
 (A) Rectangles مستطیلوں کا (B) Squares مربعوں کا (C) Circles دائروں کا (D) Triangles مثلثوں کا
- (4) The extent of variation between two extreme observations of a data set is measured by: کسی دیئے گئے مواد کی انتہائی مدت کے فرق کی پیمائش کی جاتی ہے۔
 (A) Average اوسط (B) Quartiles چہارمی حصہ (C) Range سعت (D) Percentiles فی صدی حصہ
- (5) $\frac{1}{2} \operatorname{cosec} 45^\circ =$ $\frac{1}{2} \operatorname{cosec} 45^\circ$ برابر ہے۔
 (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (6) Locus of a point in a plane equidistant from a fixed point is called: مستوی کے تمام نقاط کا سیٹ جو معین نقطہ سے برابر فاصلے پر ہوں کہلاتا ہے۔
 (A) Radius رداس (B) Circle دائرہ (C) Circumference محیط (D) Diameter قطر
- (7) A line which has only one point in common with a circle is called: ایک خط جس کا دائرے کے ساتھ صرف ایک نقطہ مشترک ہو، کہتے ہیں۔
 (A) Sine of a circle sine دائرے کا (B) Cosine of a circle Cosine دائرے کا (C) Tangent of a circle Tangent دائرے کا (D) Secant of a circle Secant دائرے کا
- (8) A 4 cm long chord subtends a central angle of 60° . The radial segment of this circle is: ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے۔ دائرے کا رداس _____ ہوگا۔
 (A) 1 cm (B) 2 cm (C) 3 cm (D) 4 cm
- (9) The measure of the external angle of a regular hexagon is: ایک منظم سدس کے بیرونی زاویوں کی مقدار ہوتی ہے۔
 (A) $\pi/3$ (B) $\pi/4$ (C) $\pi/6$ (D) $\pi/9$
- (10) Standard form of quadratic equation is: دو درجی مساوات کی معیاری شکل ہے۔
 (A) $bx + c = 0, b \neq 0$ (B) $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ (C) $ax^2 = bx, a \neq 0$ (D) $ax^2 = 0, a \neq 0$
- (11) If α, β are the roots of $px^2 + qx + r = 0$, then sum of the roots 2α and 2β is: اگر α, β مساوات $px^2 + qx + r = 0$ کے روٹس (roots) ہوں تو 2α اور 2β کا مجموعہ ہے۔
 (A) $\frac{-q}{p}$ (B) $\frac{r}{p}$ (C) $\frac{-2q}{p}$ (D) $\frac{-q}{2p}$
- (12) The nature of the roots of equation $ax^2 + bx + c = 0$ is determined by: مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ کے روٹس کی اقسام کو _____ سے معلوم کرتے ہیں۔
 (A) Sum of roots روٹس کا مجموعہ (B) Product of the roots روٹس کا حاصل ضرب (C) Synthetic division ترکیبی تقسیم (D) Discriminant فرق کنندہ
- (13) Find x in proportion $4 : x :: 5 : 15$. تناسب $4 : x :: 5 : 15$ میں x معلوم کیجیے۔
 (A) $\frac{75}{4}$ (B) $\frac{4}{3}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) 12
- (14) If $u \propto v^2$, then: اگر $u \propto v^2$ تو۔
 (A) $u = v^2$ (B) $u = kv^2$ (C) $uv^2 = k$ (D) $uv^2 = 1$
- (15) $\frac{x^3 + 1}{(x - 1)(x + 2)}$ is: $\frac{x^3 + 1}{(x - 1)(x + 2)}$ ایک _____ ہے۔
 (A) A proper fraction واجب کسر (B) An improper fraction غیر واجب کسر (C) An identity مماثلت (D) A constant term مستقل رقم

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) Locus of a point in a plane equidistant from a fixed point is called: _____ کہلاتا ہے۔ (1)
- (A) Radius رداس (B) Circle دائرہ (C) Circumference محیط (D) Diameter قطر
- (2) A line which has only one point in common with a circle is called: _____ کہتے ہیں۔ (2)
- (A) Sine of a circle دائرے کا sine (B) Cosine of a circle دائرے کا Cosine (C) Tangent of a circle دائرے کا Tangent (D) Secant of a circle دائرے کا Secant
- (3) A 4 cm long chord subtends a central angle of 60° . The radial segment of this circle is: _____ ہوگا۔ (3)
- (A) 1 cm (B) 2 cm (C) 3 cm (D) 4 cm
- (4) The measure of the external angle of a regular hexagon is: _____ ایک منظم سدس کے بیرونی زاویوں کی مقدار ہوتی ہے۔ (4)
- (A) $\pi/3$ (B) $\pi/4$ (C) $\pi/6$ (D) $\pi/9$
- (5) Standard form of quadratic equation is: _____ دوجہ مساوات کی معیاری شکل ہے۔ (5)
- (A) $bx + c = 0, b \neq 0$ (B) $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ (C) $ax^2 = bx, a \neq 0$ (D) $ax^2 = 0, a \neq 0$
- (6) If α, β are the roots of $px^2 + qx + r = 0$, then sum of the roots 2α and 2β is: _____ اگر α, β مساوات $px^2 + qx + r = 0$ کے روٹس (roots) ہوں تو 2α اور 2β کا مجموعہ ہے۔ (6)
- (A) $\frac{-q}{p}$ (B) $\frac{r}{p}$ (C) $\frac{-2q}{p}$ (D) $\frac{-q}{2p}$
- (7) The nature of the roots of equation $ax^2 + bx + c = 0$ is determined by: _____ مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ کے روٹس کی اقسام کو _____ سے معلوم کرتے ہیں۔ (7)
- (A) Sum of roots روٹس کا مجموعہ (B) Product of the roots روٹس کا حاصل ضرب (C) Synthetic division ترکیبی تقسیم (D) Discriminant فرق کنندہ
- (8) Find x in proportion $4 : x :: 5 : 15$. _____ تناسب $4 : x :: 5 : 15$ میں x معلوم کیجیے۔ (8)
- (A) $\frac{75}{4}$ (B) $\frac{4}{3}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) 12
- (9) If $u \propto v^2$, then: _____ اگر $u \propto v^2$ تو: (9)
- (A) $u = v^2$ (B) $u = kv^2$ (C) $uv^2 = k$ (D) $uv^2 = 1$
- (10) $\frac{x^3 + 1}{(x-1)(x+2)}$ is: _____ ایک _____ ہے۔ (10)
- (A) A proper fraction واجب کسر (B) An improper fraction غیر واجب کسر (C) An identity مماثلت (D) A constant term مستقل رقم
- (11) The set $\{x / x \in w \wedge x \leq 101\}$ is: _____ سیٹ $\{x / x \in w \wedge x \leq 101\}$ کہلاتا ہے۔ (11)
- (A) Subset ختمی سیٹ (B) Empty set خالی سیٹ (C) Infinite set غیر متناہی سیٹ (D) Finite set متناہی سیٹ
- (12) If number of elements in set A is 3 and in set B is 2, then number of binary relations in $A \times B$ is: _____ اگر کسی سیٹ A میں ارکان کی تعداد 3 اور سیٹ B میں 2 ہو تو $A \times B$ کے ثنائی روابط کی تعداد ہوتی ہے۔ (12)
- (A) 2^3 (B) 2^6 (C) 2^8 (D) 2^2
- (13) A histogram is a set of adjacent: _____ کالمی نقشہ مجموعہ ہے متعلقہ _____ (13)
- (A) Rectangles مستطیلوں کا (B) Squares مربعوں کا (C) Circles دائروں کا (D) Triangles مثلثوں کا
- (14) The extent of variation between two extreme observations of a data set is measured by: _____ کسی دیئے گئے مواد کی انتہائی مدات کے فرق کی پیمائش کی جاتی ہے۔ (14)
- (A) Average اوسط (B) Quartiles چہارمی حصہ (C) Range سعت (D) Percentiles فی صدی حصہ
- (15) $\frac{1}{2} \operatorname{cosec} 45^\circ =$ _____ (15)
- (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

PAPER CODE

NUMBER: 3198

2020 (A)

SSC PART-II (10th CLASS)

رول نمبر

ریاضی (سائنس گروپ)

گروپ - دوسرا

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-II

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

کل نمبر = 15

MAXIMUM MARKS: 15

نوٹ - ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کر یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوال پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

سوال نمبر 1-

Q.No.1

(1) Find x in proportion $4 : x :: 5 : 15$.

(A) $\frac{75}{4}$

(B) $\frac{4}{3}$

(C) $\frac{3}{4}$

(D) 12

(1) تناسب $4 : x :: 5 : 15$ میں x معلوم کیجیے۔(2) If $u \propto v^2$, then:

(A) $u = v^2$

(B) $u = kv^2$

(C) $uv^2 = k$

(D) $uv^2 = 1$

(2) اگر $u \propto v^2$ تو:-(3) $\frac{x^3 + 1}{(x - 1)(x + 2)}$ is:

(A) A proper fraction واجب کسر

(C) An identity مماثلت

(B) An improper fraction غیر واجب کسر

(D) A constant term مستقل رقم

(3) $\frac{x^3 + 1}{(x - 1)(x + 2)}$ ایک _____ ہے۔(4) The set $\{x / x \in W \wedge x \leq 101\}$ is:

(A) Subset ختمی سیٹ

(B) Empty set خالی سیٹ

(C) Infinite set غیر متناہی سیٹ

(4) سیٹ $\{x / x \in W \wedge x \leq 101\}$ _____ ہے۔

(5) If number of elements in

set A is 3 and in set B is 2, then number of binary relations in $A \times B$ is:

(A) 2^3

(B) 2^6

(C) 2^8

(D) 2^2

(6) A histogram is a set of adjacent:

(A) Rectangles مستطیلوں کا

(B) Squares مربعوں کا

(C) Circles دائروں کا

(D) Triangles مثلثوں کا

(7) The extent of variation between two extreme observations of a data set is measured by:

(A) Average اوسط

(B) Quartiles چہاری حصہ

(C) Range سعت

(D) Percentiles فی صدی حصہ

(8) $\frac{1}{2} \operatorname{cosec} 45^\circ =$ _____

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(B) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

(C) $\sqrt{2}$

(D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(8) $\frac{1}{2} \operatorname{cosec} 45^\circ$ برابر ہے۔

(9) Locus of a point in a plane equidistant from a fixed point is called:

(A) Radius رداس

(B) Circle دائرہ

(C) Circumference محیط

(D) Diameter قطر

(10) A line which has only one point in common with a circle is called:

(A) Sine of a circle sine دائرے کا

(B) Cosine of a circle Cosine دائرے کا

(C) Tangent of a circle Tangent دائرے کا

(D) Secant of a circle Secant دائرے کا

(11) A 4 cm long chord subtends a central angle of 60° . The radial segment of this circle is:

(A) 1 cm

(B) 2 cm

(C) 3 cm

(D) 4 cm

(11) ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے۔ دائرے کا رداس _____ ہوگا۔

(12) The measure of the external angle of a regular hexagon is:

(A) $\pi/3$

(B) $\pi/4$

(C) $\pi/6$

(D) $\pi/9$

(12) ایک منظم سدس کے بیرونی زاویوں کی مقدار ہوتی ہے۔

(13) Standard form of quadratic equation is:

(A) $bx + c = 0, b \neq 0$

(B) $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$

(C) $ax^2 = bx, a \neq 0$

(13) دو درجی مساوات کی معیاری شکل ہے۔

(14) If α, β are theroots of $px^2 + qx + r = 0$, then sum of the roots 2α and 2β is:

(A) $\frac{-q}{p}$

(B) $\frac{r}{p}$

(C) $\frac{-2q}{p}$

(D) $\frac{-q}{2p}$

(15) The nature of the roots of equation

 $ax^2 + bx + c = 0$ is determined by:

(A) Sum of roots روٹس کا مجموعہ

(B) Product of the roots روٹس کا حاصل ضرب

(C) Synthetic division ترکیبی تقسیم

(D) Discriminant فرق کنندہ

(15) مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ کے روٹس کی اقسام کو _____ سے معلوم کرتے ہیں۔